

## 大腸直腸肛門疾病癥狀系列報導 (101)

# 大腸直腸肛門疾病簡介：大腸癌診斷與治療 (二)

續前文

直腸鏡檢查/乙狀結腸鏡檢查

醫生或專科護士會查看大腸內壁，並進行細胞取樣（活組織切片）。他們會用一根細管輕輕穿過您的直腸。細管末端有一個燈和一個微型攝像頭。直腸鏡是一根短管，直接進入直腸。乙狀結腸鏡是一根長管，它會穿過直腸進入大腸。直腸鏡或乙狀結腸鏡可能會讓您感覺不舒服，但一般不疼。

結腸鏡檢查

若需檢查整個大腸的內部，您的醫生會進行結腸鏡檢查。檢查期間，他們會對細胞拍照並進行活組織切片。該檢查期間，腸道需要完全清空。這就意味着，在進行檢查之前的一天，您要注意飲食，然後要用藥（瀉藥）來清理腸道。您所在的醫院會告訴您該怎麼做。結腸鏡檢查可能會讓您感覺不舒服，但是您會被注射一支鎮定劑，這將有助於您放鬆。

虛擬結腸鏡檢查 (CT 結腸鏡)

CT 掃描儀會對您的腸道進行一系列 X 光拍照。然後電腦會將這些照片組合起來，形成腸道的三維圖像。掃描時，您的腸道需要完全清空。您可

能會被注射藥物，這有助於放鬆您的腸道肌肉。於此同時，您還可能需要接受染料注射（造影劑）。如果您需要該注射，您的醫生會告訴您。

進一步檢查

如果活組織切片檢查表明您患有癌症，您還需要進行其他檢查，目的是查明腫瘤的大小和位置。

這些檢查可能包括：

- 驗血
- 胸部 X 光拍片
- CT 掃描
- CT/PET 掃描
- MRI 掃描
- 銀灌腸
- 超聲波掃描

您的醫生或護士會說明您將進行哪些檢查，以及接下來會發生什麼。等待化驗結果時，您可能會感到焦慮。向親屬或朋友傾訴您的擔憂可能會有所幫助。

分期和等級

了解癌症的分期和等級，有助於醫生為您制定最好的治療方法。

分期

腸道癌分為四個階段：

- 1 期 - 癌症只在原腫瘤中，沒有擴散。
- 2 期 - 腫瘤已經穿過腸

道壁，生長到附近的組織中，但沒有擴散到附近的淋巴結。

- 3 期 - 腫瘤細胞已擴散到附近的淋巴結。

- 4 期 - 癌症已經擴散到身體其他部位。

等級

等級會顯示與正常腸道細胞相比，癌細胞在顯微鏡下是什麼樣子。

- 等級 1 (低等) - 癌細胞跟正常細胞看起來差不多，生長很緩慢。

- 等級 2 (中等) - 癌細胞看起來較為異常，生長速度略微加快。

- 等級 3 (高等) - 癌細胞看起來跟正常細胞相差很多，生長迅速。

治療

確定最佳治療方法並非易事。您的醫生需要考慮很多因素。最重要的幾點包括：

- 癌症的分期和等級
- 您的總體健康狀況
- 治療可能的副作用
- 您對可能出現的副作用的看法

儘管您的醫生非常清楚接下來您需要哪種治療方法，但您可能需要先進行一項手術，然後醫生才能為您制訂最佳治療方案。與

## 大腸直腸外科醫師／熊維羣

乙狀結腸切除術 - 切除乙狀結腸。


手術時，包含腫瘤的那部分腸道會被切除，然後將敞開的腸道兩端連接起來。如果腸道無法連接，可能需要一個人造孔。也就是在胃壁的腸道上開一個口。這可能是暫時的，也可能是永久的。

您的醫生和專科護士在您接受手術治療前會與您談到這方面。以下有關於人造孔的更多資訊。結腸附近的淋巴結也會被切除。因為癌症首先會擴散到這裡。

直腸癌的手術治療

全直腸系膜切除術 (TME) - 切除整個直腸及其週圍的脂肪組織。該組織含有淋巴結。TME 手術採用不同的方式實施。這取決於直腸中癌症的位置。

半結腸切除術 - 切除一半結腸。根據癌症的位置，可能是左側或右側結腸。



連接起來。如果腸道無法連接，您可能需要一個人造孔。

早期腸道癌的手術治療

有時候，透過局部切除術或經肛門局部切除術，可以切除一些較小的、處於極早期的惡性腸道腫瘤。手術器械會經過肛門進入直腸或結腸，以切除惡性腫瘤。如果腫瘤等級較高，您可能需要進行第二次手術，以切除更多腸道。切除惡性腫瘤的方法有多種，要根據腫瘤在腸道中的位置而定。您的醫生會向您說明該項手術。待續

# 大腸直腸診所

## 熊維羣

醫學博士

Roger W. Hsiung, M.D., F.A.C.S.

美國外科手術委員會認證

美國大腸直腸外科手術委員會認證

[www.CRCLasVegas.com](http://www.CRCLasVegas.com)

電話: 702-586-6688 (精通英、國、粵、西班牙語) 傳真: 702-586-9988

6080 S. Durango Dr., #105, Las Vegas, NV 89113